



Comme toutes les filles de mon âge,
j'accorde une place importante
à ma santé et à la prévention.

Comme moi, vérifie si tu es à jour
de tes vaccinations et parles-en
avec tes parents et avec
un professionnel de santé.

Sur le site www.immuniser-lyon.org,
tu peux retrouver toutes les informations
utiles sur les vaccinations.

Clara

Agence Elwood - Photographie : © Pierre Touboul

**Comme moi, pensez à faire
le point sur vos vaccinations.**

IMMUNISER
LYON



**POUR MOI,
C'EST FAIT.**



**Comme moi, pensez à faire
le point sur vos vaccinations.**

IMMUNISER
LYON



Pour en savoir plus, rendez-vous sur
www.immuniser-lyon.org

Avec le soutien
de Sanofi Pasteur MSD

Tableau des vaccinations recommandées
CHEZ LES ENFANTS & LES ADOLESCENTS

2016

	Vaccins contre :	2 mois	4 mois	11 mois	12 mois	16-18 mois	6 ans	11-13 ans	15 ans	16-18 ans
Recommandations générales	Diphtérie (D), Tétanos (T), Coqueluche acellulaire (Ca), Poliomyélite (P)	DTCaP	DTCaP	DTCaP			DTCaP			
	Haemophilus influenzae b (Hib)	Hib	Hib	Hib						
	Hépatite B (Hep B)	Hep B	Hep B	Hep B						
	Pneumocoque (PnC) ⁽¹⁾	PnC	PnC	PnC						
	Méningocoque C (vaccin conjugué)				MnC					
	Rougeole (R), Oreillons (O), Rubéole (R)				ROR 1	ROR 2				
	Diphtérie (D), Tétanos (T), Coqueluche acellulaire (Ca), Poliomyélite (P)							dTcaP		
	Papillomavirus humains (HPV) chez les jeunes filles							Vaccin quadrivalent (11/13 ans) et vaccin bivalent (11/14 ans) : 2 doses (0, 6 mois)		
Rattrapage	Hépatite B					3 doses selon le schéma 0, 1, 6 mois ou, de 11 à 15 ans révolus, 2 doses selon le schéma 0, 6 mois ⁽¹⁾				
	Méningocoque C (vaccin conjugué)					1 dose jusqu'à 24 ans ⁽¹⁾				
	Papillomavirus humains (HPV) chez les jeunes filles								3 doses selon le schéma 0, 1, 6 mois ou 0, 2, 6 mois (jeunes filles de 14 ou 15 à 19 ans révolus) selon le vaccin utilisé	
	Rougeole (R), Oreillons (O), Rubéole (R)						2 doses à au moins 1 mois d'intervalle si pas de vaccin antérieur ; 1 dose si une seule dose vaccinale antérieure			

1) Vous trouverez les détails sur le Calendrier des Vaccinations et Recommandations Vaccinales 2016 du Ministère de la Santé, p.33 : http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/calendrier_vaccinal_2016.pdf
Source : D'après le calendrier simplifié de l'INPES (Institut National de Prévention et d'Education pour la Santé) tiré des Recommandations Vaccinales 2016.



Comme mes amis, j'accorde une place importante à ma santé et à la prévention.

Comme moi, vérifie si tu es à jour de tes vaccinations et parles-en avec un professionnel de santé.

Sur le site www.immuniser-lyon.org, tu peux retrouver toutes les informations utiles sur les vaccinations.

Amaury

Agence Elwood - Photographie : © Pierre Touboul

Comme moi, pensez à faire le point sur vos vaccinations.

IMMUNISER
LYON



**POUR MOI,
C'EST FAIT.**



Comme moi, pensez à faire le point sur vos vaccinations.

IMMUNISER
LYON



Pour en savoir plus, rendez-vous sur
www.immuniser-lyon.org

Avec le soutien
de Sanofi Pasteur MSD

Tableau des vaccinations recommandées
CHEZ LES ENFANTS & LES ADOLESCENTS

2016

	Vaccins contre :	2 mois	4 mois	11 mois	12 mois	16-18 mois	6 ans	11-13 ans	15 ans	16-18 ans
Recommandations générales	Diphtérie (D), Tétanos (T), Coqueluche acellulaire (Ca), Poliomyélite (P)	DTCaP	DTCaP	DTCaP			DTCaP			
	Haemophilus influenzae b (Hib)	Hib	Hib	Hib						
	Hépatite B (Hep B)	Hep B	Hep B	Hep B						
	Pneumocoque (PnC) ⁽¹⁾	PnC	PnC	PnC						
	Méningocoque C (vaccin conjugué)				MnC					
	Rougeole (R), Oreillons (O), Rubéole (R)				ROR 1	ROR 2				
	Diphtérie (D), Tétanos (T), Coqueluche acellulaire (Ca), Poliomyélite (P)							dTcaP		
	Papillomavirus humains (HPV) chez les jeunes filles							Vaccin quadrivalent (11/13 ans) et vaccin bivalent (11/14 ans) : 2 doses (0, 6 mois)		
Rattrapage	Hépatite B					3 doses selon le schéma 0, 1, 6 mois ou, de 11 à 15 ans révolus, 2 doses selon le schéma 0, 6 mois ⁽¹⁾				
	Méningocoque C (vaccin conjugué)					1 dose jusqu'à 24 ans ⁽¹⁾				
	Papillomavirus humains (HPV) chez les jeunes filles								3 doses selon le schéma 0, 1, 6 mois ou 0, 2, 6 mois (jeunes filles de 14 ou 15 à 19 ans révolus) selon le vaccin utilisé	
	Rougeole (R), Oreillons (O), Rubéole (R)						2 doses à au moins 1 mois d'intervalle si pas de vaccin antérieur ; 1 dose si une seule dose vaccinale antérieure			

1) Vous trouverez les détails sur le Calendrier des Vaccinations et Recommandations Vaccinales 2016 du Ministère de la Santé, p.33 : http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/calendrier_vaccinal_2016.pdf
Source : D'après le calendrier simplifié de l'INPES (Institut National de Prévention et d'Education pour la Santé) tiré des Recommandations Vaccinales 2016.



**POUR MOI,
C'EST FAIT.**

Comme toutes les mamans,
j'accorde une place importante
à la santé et à la prévention.

Comme moi, protégez-vous,
et protégez-le dès le premier âge,
en suivant les recommandations
du calendrier vaccinal.

Parlez-en avec un professionnel de santé.

Sur le site www.immuniser-lyon.org,
vous pouvez retrouver toutes les
informations utiles sur les vaccinations.

Noémie

Agence Elwood - Photographie : © Pierre Touboul

**Comme moi, pensez à faire
le point sur vos vaccinations.**

**IMMUNISER
LYON**



**Comme moi, pensez à faire
le point sur vos vaccinations.**

**IMMUNISER
LYON**



Pour en savoir plus, rendez-vous sur
www.immuniser-lyon.org

Avec le soutien
de Sanofi Pasteur MSD

Tableau des vaccinations recommandées

CHEZ LES ENFANTS & LES ADOLESCENTS

2016

	Vaccins contre :	2 mois	4 mois	11 mois	12 mois	16-18 mois	6 ans	11-13 ans	15 ans	16-18 ans
Recommandations générales	Diphtérie (D), Tétanos (T), Coqueluche acellulaire (Ca), Poliomyélite (P)	DTCaP	DTCaP	DTCaP			DTCaP	dTcaP		
	Haemophilus influenzae b (Hib)	Hib	Hib	Hib						
	Hépatite B (Hep B)	Hep B	Hep B	Hep B						
	Pneumocoque (PnC) ⁽¹⁾	PnC	PnC	PnC						
	Méningocoque C (vaccin conjugué)				MnC					
	Rougeole (R), Oreillons (O), Rubéole (R)				ROR 1	ROR 2				
	Papillomavirus humains (HPV) chez les jeunes filles							Vaccin quadrivalent (11/13 ans) et vaccin bivalent (11/14 ans) : 2 doses (0, 6 mois)		
Rattrapage	Hépatite B					3 doses selon le schéma 0, 1, 6 mois ou, de 11 à 15 ans révolus, 2 doses selon le schéma 0, 6 mois ⁽¹⁾				
	Méningocoque C (vaccin conjugué)					1 dose jusqu'à 24 ans ⁽¹⁾				
	Papillomavirus humains (HPV) chez les jeunes filles								3 doses selon le schéma 0, 1, 6 mois ou 0, 2, 6 mois (jeunes filles de 14 ou 15 à 19 ans révolus) selon le vaccin utilisé	
	Rougeole (R), Oreillons (O), Rubéole (R)						2 doses à au moins 1 mois d'intervalle si pas de vaccin antérieur ; 1 dose si une seule dose vaccinale antérieure			

1) Vous trouverez les détails sur le Calendrier des Vaccinations et Recommandations Vaccinales 2016 du Ministère de la Santé, p.33 : http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/calendrier_vaccinal_2016.pdf
 Source : D'après le calendrier simplifié de l'INPES (Institut National de Prévention et d'Education pour la Santé) tiré des Recommandations Vaccinales 2016.