



Comme beaucoup de gens, j'accorde une place importante à ma santé et à la prévention.

Comme moi, pensez à faire votre bilan vaccinal dans votre suivi régulier de santé et parlez-en avec votre professionnel de santé.

Sur le site www.immuniser-lyon.org, vous pouvez retrouver toutes les informations utiles sur les vaccinations.

Jimmy

Agence Elwood - Photographie : © Pierre Touboul

**POUR MOI,
C'EST FAIT.**



Comme moi, pensez à faire le point sur vos vaccinations.

**IMMUNISER
LYON**

Comme moi, pensez à faire le point sur vos vaccinations.

**IMMUNISER
LYON**



Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.immuniser-lyon.org

Tableau des vaccinations recommandées

CHEZ LES ADULTES (en dehors des vaccinations réalisées en milieu professionnel)

2016

	Vaccins contre :	18-24 ans	25 ans	35 ans	45 ans	65 ans	> 65 ans
Recommandations générales	Diphthérie (d), Tétanos (T), Poliomyélite (P)		Rappel dTcaP1 ou dTP si dernier rappel de dTcaP < 5 ans		Rappel dTP	Rappel dTP	Rappel dTP à 75, 85 ans...
	Coqueluche acellulaire (Ca)						
	Grippe					1 dose annuelle	
	Zona					Entre 65 à 74 ans : 1 dose ⁽²⁾	
Rattrapage	Coqueluche acellulaire (Ca)		1 dose dTcaPolio chez l'adulte jusqu'à 39 ans révolus, n'ayant pas reçu de rappel à 25 ans				
	Méningocoque C (vaccin conjugué)	1 dose ⁽¹⁾					
	Papillomavirus humains (HPV) chez jeunes femmes	3 doses selon le schéma 0, 1, 6 mois ou 0, 2, 6 mois (jeunes femmes jusqu'à l'âge de 19 ans révolus)					
	Rougeole (R), Oreillons (O), Rubéole (R)	Atteindre 2 doses au total chez les personnes nées depuis 1980					
	Rubéole				1 dose de ROR chez les femmes non vaccinées		
	Zona						Rattrapage entre 75 et 79 ans
Populations particulières et à risque (ex : diabète, maladie cardio-vasculaire, surpoids) ⁽¹⁾ Parlez-en avec votre médecin.	Coqueluche acellulaire (Ca)	Cocooning ⁽¹⁾ : Personnes non vaccinées depuis l'enfance : 1 dose de dTcaPolio ⁽¹⁾ . Pour les personnes antérieurement vaccinées à l'âge adulte et à nouveau en situation de cocooning, revaccination si la dernière dose de vaccin coquelucheux date de plus de 10 ans (délai minimal d'un mois entre 1 dose de dTPolio et 1 dose de dTcaPolio)					
	Grippe	1 dose annuelle si risque particulier ⁽¹⁾					
	Hépatite A	2 doses selon le schéma : 0, 6 mois si exposition à un risque particulier ⁽¹⁾					
	Hépatite B	3 doses selon le schéma : 0, 1, 6 mois si exposition à un risque particulier ⁽¹⁾ . Pour certains cas particuliers, cf. infra ⁽¹⁾					
	Méningocoque ACYW (conjugué)	1 dose au contact d'un cas ⁽¹⁾					
	Méningocoque B	2 doses à un mois d'intervalle chez les personnes ayant un déficit en complément ou en properdine, recevant un traitement anti-C5A ou aspléniques et chez les personnes ayant reçu une greffe de cellules souches hématopoïétiques					
	Pneumocoque	Pour les adultes à risque élevé d'infection invasive à pneumocoque ⁽¹⁾ , voir les différents schémas vaccinaux et tableau (paragraphe 2.11)					
Varicelle	2 doses ⁽¹⁾ si risque particulier						

1) Vous trouverez les détails sur le Calendrier des Vaccinations et Recommandations Vaccinales 2016 du Ministère de la Santé, p.33 : http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/calendrier_vaccinal_2016.pdf

2) Ce vaccin est contre-indiqué chez les personnes immunodéprimées. Source : D'après le calendrier simplifié de l'INPES (Institut National de Prévention et d'Éducation pour la Santé) tiré des Recommandations Vaccinales 2016.



Comme mes amis, j'accorde une place importante à ma santé et à la prévention.

Comme moi, vérifie si tu es à jour de tes vaccinations et parles-en avec un professionnel de santé.

Sur le site www.immuniser-lyon.org, vous pouvez retrouver toutes les informations utiles sur les vaccinations.

Amaury

Agence Elwood - Photographie : © Pierre Touboul

**POUR MOI,
C'EST FAIT.**



Comme moi, pensez à faire le point sur vos vaccinations.

**IMMUNISER
LYON**

Comme moi, pensez à faire le point sur vos vaccinations.

**IMMUNISER
LYON**



Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.immuniser-lyon.org

Tableau des vaccinations recommandées

CHEZ LES ADULTES (en dehors des vaccinations réalisées en milieu professionnel)

2016

	Vaccins contre :	18-24 ans	25 ans	35 ans	45 ans	65 ans	> 65 ans
Recommandations générales	Diphtérie (d), Tétanos (T), Poliomyélite (P)		Rappel dTcaP1 ou dTP si dernier rappel de dTcaP < 5 ans		Rappel dTP	Rappel dTP	Rappel dTP à 75, 85 ans...
	Coqueluche acellulaire (Ca)						
	Grippe					1 dose annuelle	
	Zona					Entre 65 à 74 ans : 1 dose ⁽²⁾	
Rattrapage	Coqueluche acellulaire (Ca)		1 dose dTcaPolio chez l'adulte jusqu'à 39 ans révolus, n'ayant pas reçu de rappel à 25 ans				
	Méningocoque C (vaccin conjugué)	1 dose ⁽¹⁾					
	Papillomavirus humains (HPV) chez jeunes femmes	3 doses selon le schéma 0, 1, 6 mois ou 0, 2, 6 mois (jeunes femmes jusqu'à l'âge de 19 ans révolus)					
	Rougeole (R), Oreillons (O), Rubéole (R)	Atteindre 2 doses au total chez les personnes nées depuis 1980					
	Rubéole				1 dose de ROR chez les femmes non vaccinées		
	Zona						Rattrapage entre 75 et 79 ans
Populations particulières et à risque (ex : diabète, maladie cardio-vasculaire, surpoids) ⁽¹⁾ Parlez-en avec votre médecin.	Coqueluche acellulaire (Ca)	Cocooning ⁽¹⁾ : Personnes non vaccinées depuis l'enfance : 1 dose de dTcaPolio ⁽¹⁾ . Pour les personnes antérieurement vaccinées à l'âge adulte et à nouveau en situation de cocooning, revaccination si la dernière dose de vaccin coquelucheux date de plus de 10 ans (délai minimal d'un mois entre 1 dose de dTPolio et 1 dose de dTcaPolio)					
	Grippe	1 dose annuelle si risque particulier ⁽¹⁾					
	Hépatite A	2 doses selon le schéma : 0, 6 mois si exposition à un risque particulier ⁽¹⁾					
	Hépatite B	3 doses selon le schéma : 0, 1, 6 mois si exposition à un risque particulier ⁽¹⁾ . Pour certains cas particuliers, cf. infra ⁽¹⁾					
	Méningocoque ACYW (conjugué)	1 dose au contact d'un cas ⁽¹⁾					
	Méningocoque B	2 doses à un mois d'intervalle chez les personnes ayant un déficit en complément ou en properdine, recevant un traitement anti-C5A ou aspléniques et chez les personnes ayant reçu une greffe de cellules souches hématopoïétiques					
	Pneumocoque	Pour les adultes à risque élevé d'infection invasive à pneumocoque ⁽¹⁾ , voir les différents schémas vaccinaux et tableau (paragraphe 2.11)					
	Varicelle	2 doses ⁽¹⁾ si risque particulier					

1) Vous trouverez les détails sur le Calendrier des Vaccinations et Recommandations Vaccinales 2016 du Ministère de la Santé, p.33 : http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/calendrier_vaccinal_2016.pdf

2) Ce vaccin est contre-indiqué chez les personnes immunodéprimées. Source : D'après le calendrier simplifié de l'INPES (Institut National de Prévention et d'Éducation pour la Santé) tiré des Recommandations Vaccinales 2016.



**POUR MOI,
C'EST FAIT.**



Comme beaucoup de gens,
j'accorde une place importante
à ma santé et à la prévention.

Comme moi, pour rester actif,
préservez votre capital santé,
en vous interrogeant sur votre bilan vaccinal.
Parlez-en avec un professionnel de santé.

Sur le site www.immuniser-lyon.org,
vous pouvez retrouver toutes les
informations utiles sur les vaccinations.

Alexandre

Agence Elwood - Photographie : © Pierre Touboul

**Comme moi, pensez à faire
le point sur vos vaccinations.**

**IMMUNISER
LYON**

**Comme moi, pensez à faire
le point sur vos vaccinations.**

**IMMUNISER
LYON**



Pour en savoir plus, rendez-vous sur
www.immuniser-lyon.org

Tableau des vaccinations recommandées

CHEZ LES ADULTES (en dehors des vaccinations réalisées en milieu professionnel)

2016

	Vaccins contre :	18-24 ans	25 ans	35 ans	45 ans	65 ans	> 65 ans
Recommandations générales	Diphthérie (d), Tétanos (T), Poliomyélite (P)		Rappel dTcaP1 ou dTP si dernier rappel de dTcaP < 5 ans		Rappel dTP	Rappel dTP	Rappel dTP à 75, 85 ans...
	Coqueluche acellulaire (Ca)						
	Grippe					1 dose annuelle	
	Zona					Entre 65 à 74 ans : 1 dose ⁽²⁾	
Rattrapage	Coqueluche acellulaire (Ca)		1 dose dTcaPolio chez l'adulte jusqu'à 39 ans révolus, n'ayant pas reçu de rappel à 25 ans				
	Méningocoque C (vaccin conjugué)	1 dose ⁽¹⁾					
	Papillomavirus humains (HPV) chez jeunes femmes	3 doses selon le schéma 0, 1, 6 mois ou 0, 2, 6 mois (jeunes femmes jusqu'à l'âge de 19 ans révolus)					
	Rougeole (R), Oreillons (O), Rubéole (R)	Atteindre 2 doses au total chez les personnes nées depuis 1980					
	Rubéole				1 dose de ROR chez les femmes non vaccinées		
	Zona						Rattrapage entre 75 et 79 ans
Populations particulières et à risque (ex : diabète, maladie cardio-vasculaire, surpoids) ⁽¹⁾ Parlez-en avec votre médecin.	Coqueluche acellulaire (Ca)	Cocooning ⁽¹⁾ : Personnes non vaccinées depuis l'enfance : 1 dose de dTcaPolio ⁽¹⁾ . Pour les personnes antérieurement vaccinées à l'âge adulte et à nouveau en situation de cocooning, revaccination si la dernière dose de vaccin coquelucheux date de plus de 10 ans (délai minimal d'un mois entre 1 dose de dTPolio et 1 dose de dTcaPolio)					
	Grippe	1 dose annuelle si risque particulier ⁽¹⁾					
	Hépatite A	2 doses selon le schéma : 0, 6 mois si exposition à un risque particulier ⁽¹⁾					
	Hépatite B	3 doses selon le schéma : 0, 1, 6 mois si exposition à un risque particulier ⁽¹⁾ . Pour certains cas particuliers, cf. infra ⁽¹⁾					
	Méningocoque ACYW (conjugué)	1 dose au contact d'un cas ⁽¹⁾					
	Méningocoque B	2 doses à un mois d'intervalle chez les personnes ayant un déficit en complément ou en properdine, recevant un traitement anti-C5A ou aspléniques et chez les personnes ayant reçu une greffe de cellules souches hématopoïétiques					
	Pneumocoque	Pour les adultes à risque élevé d'infection invasive à pneumocoque ⁽¹⁾ , voir les différents schémas vaccinaux et tableau (paragraphe 2.11)					
Varicelle	2 doses ⁽¹⁾ si risque particulier						

1) Vous trouverez les détails sur le Calendrier des Vaccinations et Recommandations Vaccinales 2016 du Ministère de la Santé, p.33 : http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/calendrier_vaccinal_2016.pdf

2) Ce vaccin est contre-indiqué chez les personnes immunodéprimées. Source : D'après le calendrier simplifié de l'INPES (Institut National de Prévention et d'Éducation pour la Santé) tiré des Recommandations Vaccinales 2016.



Comme beaucoup de jeunes retraités,
j'accorde une place importante à ma santé
et à la prévention.

Comme moi, pour une nouvelle vie
pleine et active, interrogez-vous
sur votre bilan vaccinal et parlez-en
avec votre professionnel de santé.

Sur le site www.immuniser-lyon.org,
vous pouvez retrouver toutes les
informations utiles sur les vaccinations.

Christophe

Agence Elwood - Photographie : © Pierre Touboul

**POUR MOI,
C'EST FAIT.**



**Comme moi, pensez à faire
le point sur vos vaccinations.**

**IMMUNISER
LYON**

**Comme moi, pensez à faire
le point sur vos vaccinations.**

**IMMUNISER
LYON**



Pour en savoir plus, rendez-vous sur
www.immuniser-lyon.org

Avec le soutien
de Sanofi Pasteur MSD

Tableau des vaccinations recommandées

CHEZ LES ADULTES (en dehors des vaccinations réalisées en milieu professionnel)

2016

	Vaccins contre :	18-24 ans	25 ans	35 ans	45 ans	65 ans	> 65 ans
Recommandations générales	Diphthérie (d), Tétanos (T), Poliomyélite (P)		Rappel dTcaP1 ou dTP si dernier rappel de dTcaP < 5 ans		Rappel dTP	Rappel dTP	Rappel dTP à 75, 85 ans...
	Coqueluche acellulaire (Ca)						
	Grippe					1 dose annuelle	
	Zona					Entre 65 à 74 ans : 1 dose ⁽²⁾	
Rattrapage	Coqueluche acellulaire (Ca)		1 dose dTcaPolio chez l'adulte jusqu'à 39 ans révolus, n'ayant pas reçu de rappel à 25 ans				
	Méningocoque C (vaccin conjugué)	1 dose ⁽¹⁾					
	Papillomavirus humains (HPV) chez jeunes femmes	3 doses selon le schéma 0, 1, 6 mois ou 0, 2, 6 mois (jeunes femmes jusqu'à l'âge de 19 ans révolus)					
	Rougeole (R), Oreillons (O), Rubéole (R)	Atteindre 2 doses au total chez les personnes nées depuis 1980					
	Rubéole				1 dose de ROR chez les femmes non vaccinées		
	Zona						Rattrapage entre 75 et 79 ans
Populations particulières et à risque (ex : diabète, maladie cardio-vasculaire, surpoids) ⁽¹⁾ Parlez-en avec votre médecin.	Coqueluche acellulaire (Ca)	Cocooning ⁽¹⁾ : Personnes non vaccinées depuis l'enfance : 1 dose de dTcaPolio ⁽¹⁾ . Pour les personnes antérieurement vaccinées à l'âge adulte et à nouveau en situation de cocooning, revaccination si la dernière dose de vaccin coquelucheux date de plus de 10 ans (délai minimal d'un mois entre 1 dose de dTPolio et 1 dose de dTcaPolio)					
	Grippe	1 dose annuelle si risque particulier ⁽¹⁾					
	Hépatite A	2 doses selon le schéma : 0, 6 mois si exposition à un risque particulier ⁽¹⁾					
	Hépatite B	3 doses selon le schéma : 0, 1, 6 mois si exposition à un risque particulier ⁽¹⁾ . Pour certains cas particuliers, cf. infra ⁽¹⁾					
	Méningocoque ACYW (conjugué)	1 dose au contact d'un cas ⁽¹⁾					
	Méningocoque B	2 doses à un mois d'intervalle chez les personnes ayant un déficit en complément ou en properdine, recevant un traitement anti-C5A ou aspléniques et chez les personnes ayant reçu une greffe de cellules souches hématopoïétiques					
	Pneumocoque	Pour les adultes à risque élevé d'infection invasive à pneumocoque ⁽¹⁾ , voir les différents schémas vaccinaux et tableau (paragraphe 2.11)					
	Varicelle	2 doses ⁽¹⁾ si risque particulier					

1) Vous trouverez les détails sur le Calendrier des Vaccinations et Recommandations Vaccinales 2016 du Ministère de la Santé, p.33 : http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/calendrier_vaccinal_2016.pdf

2) Ce vaccin est contre-indiqué chez les personnes immunodéprimées. Source : D'après le calendrier simplifié de l'INPES (Institut National de Prévention et d'Éducation pour la Santé) tiré des Recommandations Vaccinales 2016.



**POUR MOI,
C'EST FAIT.**

Comme beaucoup de gens de mon âge,
j'accorde une place importante
à ma santé et à la prévention.

Comme moi, pour préserver votre autonomie,
protégez-vous des maladies infectieuses,
en vous interrogeant sur votre bilan vaccinal.

Parlez-en avec votre professionnel de santé.

Sur le site www.immuniser-lyon.org,
vous pouvez retrouver toutes les
informations utiles sur les vaccinations.

Françoise

Agence Elwood - Photographie : © Pierre Touboul



**Comme moi, pensez à faire
le point sur vos vaccinations.**

**IMMUNISER
LYON**

**Comme moi, pensez à faire
le point sur vos vaccinations.**

**IMMUNISER
LYON**



Pour en savoir plus, rendez-vous sur
www.immuniser-lyon.org

Avec le soutien
de Sanofi Pasteur MSD

Tableau des vaccinations recommandées

CHEZ LES ADULTES (en dehors des vaccinations réalisées en milieu professionnel)

2016

	Vaccins contre :	18-24 ans	25 ans	35 ans	45 ans	65 ans	> 65 ans
Recommandations générales	Diphthérie (d), Tétanos (T), Poliomyélite (P)		Rappel dTcaP1 ou dTP si dernier rappel de dTcaP < 5 ans		Rappel dTP	Rappel dTP	Rappel dTP à 75, 85 ans...
	Coqueluche acellulaire (Ca)						
	Grippe					1 dose annuelle	
	Zona					Entre 65 à 74 ans : 1 dose ⁽²⁾	
Rattrapage	Coqueluche acellulaire (Ca)		1 dose dTcaPolio chez l'adulte jusqu'à 39 ans révolus, n'ayant pas reçu de rappel à 25 ans				
	Méningocoque C (vaccin conjugué)	1 dose ⁽¹⁾					
	Papillomavirus humains (HPV) chez jeunes femmes	3 doses selon le schéma 0, 1, 6 mois ou 0, 2, 6 mois (jeunes femmes jusqu'à l'âge de 19 ans révolus)					
	Rougeole (R), Oreillons (O), Rubéole (R)	Atteindre 2 doses au total chez les personnes nées depuis 1980					
	Rubéole				1 dose de ROR chez les femmes non vaccinées		
	Zona						Rattrapage entre 75 et 79 ans
Populations particulières et à risque (ex : diabète, maladie cardio-vasculaire, surpoids) ⁽¹⁾ Parlez-en avec votre médecin.	Coqueluche acellulaire (Ca)	Cocooning ⁽¹⁾ : Personnes non vaccinées depuis l'enfance : 1 dose de dTcaPolio ⁽¹⁾ . Pour les personnes antérieurement vaccinées à l'âge adulte et à nouveau en situation de cocooning, revaccination si la dernière dose de vaccin coquelucheux date de plus de 10 ans (délai minimal d'un mois entre 1 dose de dTPolio et 1 dose de dTcaPolio)					
	Grippe	1 dose annuelle si risque particulier ⁽¹⁾					
	Hépatite A	2 doses selon le schéma : 0, 6 mois si exposition à un risque particulier ⁽¹⁾					
	Hépatite B	3 doses selon le schéma : 0, 1, 6 mois si exposition à un risque particulier ⁽¹⁾ . Pour certains cas particuliers, cf. infra ⁽¹⁾					
	Méningocoque ACYW (conjugué)	1 dose au contact d'un cas ⁽¹⁾					
	Méningocoque B	2 doses à un mois d'intervalle chez les personnes ayant un déficit en complément ou en properdine, recevant un traitement anti-C5A ou aspléniques et chez les personnes ayant reçu une greffe de cellules souches hématopoïétiques					
	Pneumocoque	Pour les adultes à risque élevé d'infection invasive à pneumocoque ⁽¹⁾ , voir les différents schémas vaccinaux et tableau (paragraphe 2.11)					
	Varicelle	2 doses ⁽¹⁾ si risque particulier					

1) Vous trouverez les détails sur le Calendrier des Vaccinations et Recommandations Vaccinales 2016 du Ministère de la Santé, p.33 : http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/calendrier_vaccinal_2016.pdf

2) Ce vaccin est contre-indiqué chez les personnes immunodéprimées. Source : D'après le calendrier simplifié de l'INPES (Institut National de Prévention et d'Éducation pour la Santé) tiré des Recommandations Vaccinales 2016.